

II JAS格付分析値 (2020年度)

1. トマト加工品

| 項目 \ 品目 | | トマトジュース | トマトミックスジュース | トマトケチャップ | |
|-------------|----|---------|-------------|----------|------|
| | | | | 特級 | 標準 |
| 可溶性固形分(%) | 最高 | 6.2 | 6.1 | 34.6 | 31.9 |
| | 平均 | 5.3 | 5.6 | 32.7 | 28.7 |
| | 最低 | 4.6 | 5.2 | 30.4 | 26.3 |
| 食塩分(%) | 最高 | 0.4 | 0.4 | | |
| | 平均 | 0.2 | 0.2 | | |
| | 最低 | 0.0 | 0.0 | | |
| 無塩可溶性固形分(%) | 最高 | 6.1 | 5.8 | | |
| | 平均 | - | - | | |
| | 最低 | 4.5 | 5.0 | | |
| 粘稠度 | 最高 | 325 | 337 | 25 | 50 |
| | 平均 | 179 | 176 | 70 | 73 |
| | 最低 | 73 | 111 | 102 | 95 |
| 色調(Lb/a) | 最高 | 14.9 | 15.6 | 10.3 | 10.1 |
| | 平均 | 12.1 | 13.0 | 8.9 | 9.2 |
| | 最低 | 10.5 | 11.7 | 7.7 | 8.7 |
| 色調(a/b) | 最高 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.5 |
| | 平均 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
| | 最低 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |

(注) 粘稠度の単位は、トマトジュース、トマトミックスジュースが(秒)、
トマトケチャップが(mm)である。

2. にんじんジュース及びにんじんミックスジュース

| 項目 \ 品目 | | にんじんジュース | にんじんミックスジュース |
|---------|----|----------|--------------|
| | | | |
| | 平均 | 9.9 | 2.1 |
| | 最低 | 9.1 | 2.0 |
| pH | 最高 | 4.39 | 4.08 |
| | 平均 | 4.31 | 4.05 |
| | 最低 | 4.17 | 4.01 |

3. ウスターソース類

| 項目 \ 品目 | | ウスターソース | | 中濃ソース | | 濃厚ソース | |
|-------------|----|---------|------|-------|------|-------|------|
| | | 特級 | 標準 | 特級 | 標準 | 特級 | 標準 |
| 可溶性固形分(%) | 最高 | 48.0 | 41.5 | 45.5 | 39.2 | 47.3 | 45.5 |
| | 平均 | 38.6 | 35.7 | 38.0 | 36.3 | 38.9 | 37.5 |
| | 最低 | 33.7 | 30.4 | 31.6 | 32.3 | 33.1 | 32.9 |
| 食塩分(%) | 最高 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 7.8 | 7.7 | 7.4 |
| | 平均 | 8.2 | 8.4 | 5.4 | 6.3 | 5.7 | 6.0 |
| | 最低 | 3.7 | 6.7 | 2.6 | 4.6 | 2.6 | 4.3 |
| 無塩可溶性固形分(%) | 最高 | 38.1 | 32.3 | 41.1 | 33.1 | 40.7 | 39.2 |
| | 平均 | - | - | - | - | - | - |
| | 最低 | 26.9 | 23.1 | 28.2 | 26.8 | 28.0 | 26.7 |
| 粘度(Pa・s) | 最高 | | | 1.9 | 1.9 | 9.3 | 9.1 |
| | 平均 | | | 1.2 | 1.3 | 4.6 | 4.5 |
| | 最低 | | | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 2.0 |

(注) ウスターソースには、ウスターソース(こいくち)の分析値は含まれていない。

※ JAS法改正に伴い、H19年度より不溶性固形分の項目は削除した。

4. 醸造酢

| 項目 \ 品目 | | 穀物酢 | | 米酢 | |
|-------------|----|-----|------|------|------|
| | | 一般用 | 業務用 | 一般用 | 業務用 |
| 可溶性固形分(%) | 最高 | 5.6 | 7.4 | 10.7 | 5.9 |
| | 平均 | -- | -- | -- | -- |
| | 最低 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.8 |
| 食塩分(%) | 最高 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.1 |
| | 平均 | -- | -- | -- | -- |
| | 最低 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 無塩可溶性固形分(%) | 最高 | 5.6 | 7.4 | 9.7 | 3.9 |
| | 平均 | -- | -- | -- | -- |
| | 最低 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| 酸度(%) | 最高 | 8.4 | 10.3 | 4.9 | 10.2 |
| | 平均 | -- | -- | -- | -- |
| | 最低 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |

(注) 「希釈して使用するもの」(いわゆる高酸度酢)については集計から除外した。

平均値については種類が多く、最高値と最低値の差が大きいため算出しない。